

REMEDYPEKT

Mangime complementare per vitelli

REMEDYPEKT è un mix di sostanze utili a tamponare i problemi gastro-intestinali nei giovani animali lattanti, principalmente composto da PECTINE DELLO YOGURT, abbinato ad una bilanciata componente vitaminica minerale ed energetica. Il prodotto ha l'interessante caratteristica di poter essere parziale o totale sostituto del latte a seconda delle forme enteriche da trattare. Diventa quindi un prodotto di estrema versatilità per trattare la quasi totalità delle situazioni presenti in allevamento. Di semplice preparazione e diluizione, il prodotto è estremamente appetibile e di ottimo gusto per gli animali. Particolarmente indicato in caso di: squilibri alimentari, forme enteriche, indigestioni, disidratazione e per re-stabilizzare l'equilibrio elettrolitico ed energetico in vitelli e suinetti.

MODALITA' D'UTILIZZO - VITELLI

DIARREA GRAVE:

sospendere l'alimentazione a base di latte ricostituito ed utilizzare come segue:

Dosaggio: 100gr di **REMEDYPEKT** in 2L di acqua.

I°- II° GIORNO: somministrare in 3 pasti giornalieri a distanza di 6 ore uno dall'altro.

III°- V° GIORNO: al progressivo miglioramento integrare il latte al **REMEDYPEKT** sino alla completa scomparsa della diarrea.

DIARREA LIEVE:

I° GIORNO: Fornire 100gr di **REMEDYPEKT** in 2L di acqua suddiviso in tre pasti giornalieri.

II°- III°GIORNO: sostituire **REMEDYPEKT** al latte quale alimento principale.

Successivamente miscelare **REMEDYPEKT** al latte sino alla completa scomparsa del sintomo.

DISTURBI DIGESTIVI, STRESS, VITELLI DA RISTALLO:

I° GIORNO: fornire 200gr di **REMEDYPEKT** x 4l di acqua.

II° - VII° GIORNO: 2-3 l di latte e 2 l di **REMEDYPEKT** (100gr) nei due pasti principali.

VIII° GIORNO E OLTRE: riportare progressivamente la razione alla normalità.



REMEDYPEKT

Mangime complementare per suinetti

MODALITA' D'UTILIZZO - SUINETTI

DISFUNZIONI ALIMENTARI

Suinetti lattanti: 50gr di **REMEDYPEKT** per litro di bevanda a disposizione per 5 gg.

SVEZZAMENTO

50gr di **REMEDYPEKT** per litro di bevanda a disposizione per 2 gg. Continuare la somministrazione di **REMEDYPEKT** per altri 3-5 gg aumentando progressivamente la quantità di alimento solido fino alla razione desiderata



CONFEZIONE: secchiello da 10 Kg

N.B. il fabbisogno di liquidi degli animali è pari al 10% del peso vivo. Nel corso di patologie enteriche tale fabbisogno aumenta al 20%.
Garantire tali fabbisogni per mantenere lo stato di salute ed il benessere degli animali.