

APPLICAZIONI PODALICHE

ULCERA SOLEARE:

Dopo la disinfezione, la lesione è trattata con polvere CICATRY-MAX tramite bendaggio. La lesione presenta, dal giorno dopo, un iniziale processo riparativo e nella maggioranza dei casi è sufficiente un trattamento unico. Nelle lesioni croniche e suppurative è consigliato un secondo trattamento dopo 4-5 gg.

MALATTIA DELLA LINEA BIANCA CON DISTACCO SOLEARE:

Cospargere la lesione con polvere CICATRY-MAX e bendare con nastro catramato. Già dal giorno successivo si evidenzia un iniziale processo riparativo.

ULCERA SOLEARE DEGENERATIVA:

In caso di ulcera soleare con distacco e degenerazione del tessuto, cospargere con polvere CICATRY-MAX e bendare con nastro catramato. La lesione è parzialmente rigenerata dopo due giorni dal trattamento. Disinfettare con spray antibiotico e fare aderire la polvere CICATRY-MAX senza bendare. Già dal giorno successivo si evidenzia la quasi totale riparazione dell'ulcera.



CICATRY-MAX

**Piedi sani
Benessere animale
Maggiore
produttività**





APPLICAZIONE ALL'OMBELICO DEL VITELLO NEONATALE:

Disinfettare l'ombelico con spray antibiotico o iodio, e cospargere di polvere CICATRY-MAX.

L'essiccazione dell'ombelico avverrà più velocemente, riducendo i rischi di infezione batterica.

CONFEZIONI



Polvere assorbente, per uso topico, ad azione cicatrizzante molto efficace

Barattolo 300 gr.



Polvere spray per uso podalico, ad azione cicatrizzante, estremamente pratico ed efficace

Bomboletta 200 ml.

GENERALFARM
veterinaria e zootecnia

GENERALFARM s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it