

la tettarella è la soluzione



Scoperte dello studio

I vitelli alimentati con le Tettarelle Milk Bar hanno un migliore assorbimento del lattosio!

Scientificamente
PROVATO

Risultati della Tettarella Milk Bar:



Spessore sano, addirittura del coagulo.
Solo **3 mg/gm** di lattosio sono rimasti due ore dopo l'alimentazione.
Meno lattosio (zucchero) nell'intestino offre agli agenti patogeni meno nutrimento per alimentarsi e riduce le diarree nutrizionali!
NOTA: L'assorbimento del lattosio non può essere osservato!
Richiede analisi di laboratorio.

Risultati dalla tettarella più veloce:



Insufficiente coagulo.
Lattosio notevolmente più alto (12mg/gm) nell'abomaso nei vitelli alimentati rapidamente.
Questi vitelli avevano concentrazioni molto più elevate di lattosio nell'intestino e nelle feci.
Livelli di lattosio più elevati nell'intestino alimentano gli agenti patogeni, consentendo loro di moltiplicarsi rapidamente. Questa può essere una delle principali cause delle diarree per i vitelli.

Diarree nutrizionali

Le diarree nutrizionali sono tipicamente causate dall'eccesso di zucchero (lattosio) che entra nell'intestino e alimenta gli agenti patogeni che ci vivono. Gli agenti patogeni amano lo zucchero e si moltiplicano rapidamente. La buona notizia è che spesso le diarree nutrizionali possono essere evitate controllando il flusso di latte nel vitello. Ciò consente al sistema digestivo di fare il suo lavoro e di ridurre la quantità di zucchero che entra negli intestini.

“La digestione iniziale del latte avviene nell'abomaso (o quarto stomaco). Le diarree possono essere causate dalla mancanza di un'adeguata digestione del latte nell'abomaso. Le diarree nutrizionali sono semplicemente il risultato finale di un eccesso di lattosio negli intestini, causato dal latte che esce troppo rapidamente dall'abomaso, quindi non può essere scisso abbastanza velocemente. Le diarree nutrizionali spesso si trasformano in diarree infettive. Gli agenti patogeni utilizzano l'eccesso di lattosio come fonte di nutrienti per moltiplicarsi. Fonte - Victoria Department of Primary Industries.

I vitelli alimentati con le Tettarelle Milk Bar hanno avuto un maggiore aumento di peso di 42 giorni!

Tutti i vitelli dello studio sono stati alimentati con lo stesso volume di latte e hanno avuto libero accesso a cereali ed acqua.

I vitelli provenivano tutti dalla stessa fattoria e sono stati alloggiati nella stessa struttura, in gruppi di dimensioni simili e con le stesse condizioni climatiche.

L'unica differenza è stata la tettarella dalla quale bevevano.

I maggiori aumenti di peso giornalieri hanno avuto come risultato uno svezzamento più rapido e la riduzione di costi e lavoro.



Grammi al giorno

sollevamento semplice e efficace



Segui la Tettarella

Il sistema Segui la Tettarella di Milk Bar è stato sviluppato per semplificare l'allevamento dei vitelli per gli allevatori che allevano tutto l'anno. Sappiamo che i vitelli devono succhiare forte per rimanere in buona salute. Utilizzando il sistema Segui la Tettarella i vitelli succhiano forte fino allo svezzamento e questo dà loro maggiori aumenti di peso, una migliore digeribilità e una migliore salute.

Nascita È essenziale che il vitello riceva 2L di colostro entro 4 ore.

Protocollo

Alimentare almeno 2L di colostro da una Tettarella Colostrum Milk Bar.

Giorno 1 – Giorno 3

Pesare il vitello per assicurare un'adeguata ingestione di colostro.

Protocollo

Portare un Milk Bar 1 dotato di una Tettarella Colostrum Milk Bar al recinto dei vitelli. Questo alimentatore rimane con questo vitello.



Alimentatore

Utilizzare un Milk Bar 1 dotato di una Tettarella Colostrum Milk Bar.



Giorno 4

Introdurre il vitello ai cereali.

Protocollo

Rimuovere la Tettarella Colostrum Milk Bar dal Milk Bar 1 e sostituirlo con una NUOVA Tettarella Milk Bar. Lavare le Tettarelle Colostrum per il prossimo vitello neonato.



Alimentatore

Utilizzare un Milk Bar 1 dotato di una Tettarella Milk Bar.



Giorno 22

Inserire i vitelli in un gruppo per un migliore sviluppo sociale e un minore lavoro. Se non è possibile raggruppare i vitelli, possono essere mantenuti soli fino allo svezzamento.

Protocollo

Rimuovere tutte le Tettarelle Milk Bar del vitello dalla sua Milk Bar 1.
Posizionare la Tettarella Milk Bar nell'alimentatore di gruppo della Milk Bar di vostra scelta.
Utilizzare i tappi Milk Bar se disponete di buchi di tettarelle di ricambio.



Alimentatore

Utilizzare un alimentatore Milk Bar di vostra scelta.



GENERALFARM
veterinaria e zootecnia

GENERALFARM s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it