



ColostroBoost™

Colostro efficiente e integratore energetico per i vitelli

 **GENERALFARM**
veterinaria e zootecnia

GENERALFARM s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it

 **Agro**

PERFECT SOLUTIONS

ColostroBoost™



What is
ColostroBoost
?

Mode of
actions

How to use

Advantages
and effects

Benefits

Cos'è ColostroBoost?



Bustine con 50 g di integratore in polvere da miscelare con latte caldo di transizione o latte normale.

Contenuti:

44% proteine, 13% grassi, 23% lattosio.

Contenuti	ColostroBoost, 50 g sacchetto
Colostro in polvere ad alto contenuto di IgG	20 g /sacchetto
Contenuto di immunoglobuline	8 g IgG /sacchetto
Uovo in polvere con immunoglobuline ad alte IgY contenente anticorpi E-coli specifici per vitello	20 g /sacchetto
Lattosio	si
Lievito selenizzato, Vitamina E e Iodio	si

Modo d'uso ColostroBoost?

Applicazione

- Mescolare 50 grammi (una bustina) in 1 – 2 litri di colostro caldo (39°C) o latte di transizione
- Allattare il vitello con il biberon subito dopo la nascita
- Se necessario, ripetere nella poppata successiva

Consumo

- 1-2 bustine per vitello come integratore quando necessario


Imballaggio

- Bustine con polvere da 50 grammi
- 10 bustine in una scatola



Vantaggi di un'alimentazione ottimale del colostro

Lo sviluppo di un intestino sano dipende da un'alimentazione ottimale del colostro



Vantaggi di un'alimentazione ottimale

del colostro

Effetto sulla crescita con 3 diverse strategie di alimentazione del colostro nei primi 14 giorni.


C0 = 0% colostro sul volume tot. del latte

C7 = 7% colostro sul volume tot. del latte

C14 = 14% colostro sul volume totale del latte

Miglioramento della salute dell'intestino e aumento fino al 15% di peso giornaliero con un'alimentazione ottimale del colostro

Alimentazione colostro e aumento di peso



Contenuto di nutrienti nel colostro e nel latte

- Il contenuto di nutrienti nel colostro differisce molto rispetto al latte normale
- Il vitello deve avere almeno 200 g di IgG (immunoglobuline) dal colostro
- Necessità di almeno 4 L di colostro di buona qualità il primo giorno
- Oppure latte di transizione con fornitura di ColostroBoost

Content	Unit	Milking no. after calving					Milk
		Colostrum		Transition milk			
		1st	2nd	3rd	4th	5 & 6th	
Sostanza secca	%	24	19	16	15.5	15.3	12.2
Grassi grezzi	%	6.4	5.6	4.6	5	5	3.9
Proteina	%	13.3	8.5	6.2	5.4	4.8	3.2
Lattosio	%	2.7	4.4	4.7	4.7	4.7	5
Energia	MJ/L	6	4.8	3.9	3.8	3.8	2.8
IgG	g/l	81	58	17	12	nd	< 2

Source: Blum & Hammon 2000 and Sehested 2001

Benefici ed effetti

Apporto di colostro, anticorpi e sostanze nutritive, quando l'apporto o la qualità del colostro sono insufficienti.

Mescolare con il latte di transizione. 1 bustina per porzione.
Temperatura di alimentazione:
37-39 °C.

Assicura un buon inizio di vita.
Supporta una flora gastrointestinale sana. Aumento di peso migliorato.

Facile da usare quando necessario. 2 anni di durata se conservato in bustine.





PERFECT SOLUTIONS



GENERALFARM s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it